




www.wolterskluwer.com

الحصول على إجابات علاجية إكلينيكية باستخدام "UpToDate



إبحث في الموضوع الرئيسي. أكثر من 10,500 موضوع طبي رئيسي مبنى على الدليل، تُقدم لك المعلومات التى تحتاج إليها لتقديم الرعاية المثالية للمريض.

تدخل على الموضوعات الرئيسية في مجال علاج المرضى. **UpToDate** Language Help أمامك الفرصة لاكتساب أرصدة محانية من ساعات التعليم الطبي المستمر /CME/CE Welcome, John Smith My UpToDate CME 57.5 Log Out CPD credits management of hypertension in pregnant and postpartum wome ندعوكم لاشراك زملائكم معكم وكذلك Patient Education What's New Practice Changing UpDates المرضى في الإطلاع على هذه المعلومات. Management of hypertension in pregnant and postpartum women management of hyperte Bookmark # Print Share إطمع النص المحرر والاشارات المرجعية شاهد خطوطاً عريضة وتفصيلية داخل والرسومات الحرافيكية أو الموضوع بالكامل. Management of hypertension in pregnant and postpartum women نطاق كل موضوع رئيسي. SUMMARY & RECOMMENDATIONS ىمكنكم وضع **علامات اشارية** فيمايين Author: Phyllis August, MD, MPH · WHAT'S NEW Section Editors: Charles J Lockwood, MD, MHCM, George L Bakris. MD محتويات الموضوع، لتسهيل الرجوع إليها إضغط على الزر الذي يأخذك مباشرة إلى Deputy Editor: Vanessa A Barss, MD, FACOG INTRODUCTION ، ملخص التوصيات وأساليب العلاج. إبحث عن كلمة أو مرادف وارد في سباق أي Contributor Disclosures GENERAL PRINCIPLES عنوان رئيسي. All topics are updated as new evidence becomes available and our peer review process is complete. When to treat Literature review current through: Aug 2017. | This topic last updated: Sep 06, 2017. أنظر التاريخ الذي جرى فيه آخر تعديل على Antihypertensive therapy محتويات الموضوع الرئيسي، بناءً على الإطلاع - Overall safety What's New المستمر على أحدث نتائج البحوث. - Options Long-term risk of hypertension in women with pregnancy-associated hypertension (August 2017) Methyldopa For women with a history of gestational hypertension, preeclampsia, eclampsia, or HELLP syndrome, at least annual lifelong measurement of blood pressure is im., Beta-blockers Calcium channel blockers Read more Hydralazine Thiazide diuretics What's New Clonidine In utero exposure to beta-blockers and congenital heart disease (June 2017) بمكنك تقديم تغذية استرحاعية حيث ستكون Drugs to avoid in pregnancy Although several previous studies have suggested an association between in utero exposure to beta-blockers and congenital heart disease, the most recent study f... لها قيمة كبيرة وذلك عن طريق تقديم ACE inhibitors, ARBs, direct renin inhibitors تساؤلات وتعليقات للمحررين التابعين لنا. v Read more Mineralocorticoid receptor antagonists - Nitroprusside INTRODUCTION — There are four major hypertensive disorders that occur in pregnant women: - Options for breastfeeding mothers Physical activity . Preeclampsia - Preeclampsia - Preeclampsia refers to the syndrome of new onset of hypertension and proteinuria or new onset of hypertension and end-Diet organ dysfunction with or without proteinuria (table 1), most often after 20 weeks of gestation in a previously normotensive woman [1]. Eclampsia is diagnosed when seizures have occurred. إضغط على الزر للإطلاع على ملخص صادر ____ إضغط على زر أحد العناوين الرئيسية ليأخذك TREATMENT OF HYPERTENSION IN Chronic (preexisting) hypertension – Chronic hypertension is defined as systolic pressure ≥140 mmHg and/or diastolic pressure ≥90 mmHg that عن موقع المكتبة الطبية القومية Medline PREECLAMPSIA بشكل مباشر إلى المعلومات التي تحتاج إليها. antedates pregnancy, is present before the 20th week of pregnancy, or persists longer than 12 weeks postpartum. Indications for antihypertensive therapy مع موضوع كامل كلما كان ذلك متوافراً. Choice of drug and dose · Preeclampsia-eclampsia superimposed upon chronic hypertension - Preeclampsia-eclampsia superimposed upon chronic hypertension is - Acute therapy nsion develops worsening hypertension with new onset proteinuria or other features of preeclampsia. (See "Eclampsia".) GRAPHICS | View All شاهد كافة الرسومات الجرافيكية المرتبطة مع الموضوع (See "Gestational hypertension".) الرئيسي على شكل فورمات مختصرة وموجزة. FIGURES rtension refers to elevated blood pressure first detected after 20 weeks of gestation in the absence of proteinuria or other diagnostic features of preeclamosia. Over time, some natients with destational hypertension will develop proteinuria or end-organ - Hemodynamic changes الدخول إلى الموضوعات الرئيسية للحصول على

ستصلكم إخطارات تفيد بالتعديلات الاكلنيكية الهامة التي

بمكنك الدخول والإطلاع على برامج تعليم وتثقيف

المرضى بالمشاركة مع مرضاك.

رابط يؤدي بك إلى الإطلاع على المعلومات حول

المؤلفين والمحررين.

ملحوظة: تصوير المستخدم المسجل أثناء دخوله إلى موقع UpToDate واكتسابه لأرصدة ساعات التعليم الطبي المستمر

مزيد من المعلومات

حصل موقع UpToDate على اعتراف واعتماد من جانب الكليات والجمعيات والسلطات الرسمية في أماكن مختلفة حول العالم، وهو يعتبر مصدر معلومات وأداة تعلم مُعترف بها حول العالم، ولغرض الإطلاع والتحقق من أن بإمكانك وأنت في دولتك استخدام EMP في الوقاء متطلبات التعليم الطبي المستمر CME، والأمر متروك لكل مستخدم للموقع www.uptodate.com/cme في الوقاء متطلبات التعليم الطبي المستمر CME، والأمر متروك لكل مستخدم للموقع ق تحديد ما إذا كان استخدامه أو استخدامها لموقع UpToDate بيؤهله / يؤهله المحصول على رصيد من الساعات في مجال التعليم الطبي المستمر CME في أية دولة أو في أي تخصص.

دعم العملاء المستخدمين النهائيين

للوصول إلى خدمات دعم المستخدم النهائي للخدمات بالنسبة للمسجلين من الأفراد، أو مستخدمي منتجاتنا من العاملين في مؤسسة، نرجو الإتصال بالعناوين التالية:

البريد الإلكتروق

customerservice@uptodate.com

بالهاتف

1-800-998-6374 or +1-781-392-2000 من يوم الإثنين حتى الجمعة من الساعة 7 صباحاً حتى التاسعة مساءً (حسب توقيت الساحل الشرقي بأمريكا)

